

Kazu slimības, kas ietekmē kazu meklēšanos, apaugļošanos, grūsnību

20.09.2018

Kazu mākslīgā apsēklošana – progresīvu metožu ieviešana piena un gaļas kazu produktivitātes uzlabošanā

Veterinārārste Gunta Ēķe, t. 26363295

Profilakse – labi ēdināšanas un turēšanas apstākļi.

- Slimības, kas ietekmē
 - Iekšķīgās nelipīgās slimības
 - Infekcijas slimības

Infekcijas slimības

- Nekrobaciloze (dziļajās kūtīs, izpaužas kā nagu iekaisums)
- Botolisms (bojāta, sliktas kvalitātes skābbarība)
- Bruceloze (aborti, neauglība)
- Tuberkuloze (slikti turēšanas un ēdināšanas apstākļi)
- Pastereloze

- Leptospiroze (grauzēju klātbūtne, stāvošs ūdens ūdenstilpnēs)
- Listerioze (visjūtīgākie ir grūsnie dzīvnieki, jo šo slimību stimulē avitaminoze)
- Q-drudzis (inficējas no ar riketsijām inficētām ērcēm, lielākoties divas nedēļas pirms un pēc dzemdībām, grūsnības laikā raksturīgā pazīme ir aborti)

lekšķīgās nelipīgās slimības

- Grūsnības toksēmija (pārbarotas kazas, trīņu kazas)
- Hipokalcēmija (pēdējas sešās grūsnības nedēļās un pirmajā laktācijas nedēļā)
- Pienskābā acidoze (barojot no nenormētām silēm, barvedes pārbarojas)
- Neaoglība (alimentārā neaoglība, tuvradnieciskā neaoglība, hermafrodītisms, dzimumorgānu slimības)